



Ghidul de practică în Medicina Dentară

ALGORITMUL TERAPEUTIC LA PACIENTII SUB TERAPIE ANTIRESORBTIVĂ/ANTIANGIOGENICĂ

Autori:

Prof.univ.dr.Alexandru Bucur*

Conf.univ.dr.Octavian Dincă*

S.I.dr. Cristian Vlădan*

*Clinica de chirurgie OMF, Spitalul Clinic de chirurgie OMF "Prof.dr.D.Theodorescu" Bucureşti

1. Prof.dr.Alexandru Bucur,
2. Conf.dr.Octavian Dinca
3. S.I.dr. Cristian Vladan



CLASIFICAREA TĂRIEI APLICATE GRADELOR DE RECOMANDARE

Standard	Standardele sunt norme care trebuie aplicate rigid și trebuie urmate în cvasitotalitatea cazurilor, excepțiile fiind rare și greu de justificat.
Recomandare	Recomandările prezintă un grad scăzut de flexibilitate, nu au forța standardelor, iar atunci când nu sunt aplicate, acest lucru trebuie justificat rațional, logic și documentat.
Opțiune	Opțiunile sunt neutre din punct de vedere a alegerii unei conduite, indicând faptul că mai multe tipuri de intervenții sunt posibile și că diferiți medici pot lua decizii diferite. Ele pot contribui la procesul de instruire și nu necesită justificare.

DEFINIREA GRADELOR UTILIZATE ÎN GHIDURILE DE PRACTICĂ MEDICALĂ

Grad A	Necesită cel puțin un studiu randomizat și controlat ca parte a unei liste de studii de calitate publicate pe tema acestei recomandări. (nivele de dovezi Ia sau Ib)
Grad B	Necesită existența unor studii clinice bine controlate, dar nu randomizate, publicate pe tema acestei recomandări. (nivele de dovezi IIa, IIb sau III)
Grad C	Necesită dovezi obținute din rapoarte sau opinii ale unor comitete de experți sau din experiența clinică a unor experți recunoscuți ca autoritate în domeniu. (nivele de dovezi IV)
Grad D	Indică lipsa unor studii clinice de bună calitate aplicabile direct acestei recomandări.
Grad E	Recomandări de bună practică bazate pe experiența clinică a grupului care a elaborat acest ghid.

1. Prof.dr.Alexandru Bucur,
2. Conf.dr.Octavian Dinca
3. S.I.dr. Cristian Vladan



INTRODUCERE

Ghidul a fost elaborat cu scopul de a asista personalul medical în adoptarea deciziei terapeutice la pacienții sub terapie antiresorbtivă sau agenți antiangiogenici. Acest ghid prezintă recomandări de bună practică medicală clinică bazate pe dovezi publicate, pentru a fi luate în considerare de către medicii dentisti și de medici din alte specialități de graniță, implicați în asistarea pacienților aflați sub terapie antiresorbtivă sau agenți antiangiogenici.

Populația țintă acoperită de acest ghid este reprezentată de adulți (> 18 ani).

Deși ghidul reprezintă o fundamentare a bunei practici medicale bazate pe cele mai recente dovezi științifice disponibile în domeniu, nu trebuie considerat că aceste recomandări includ toate intervențiile potrivite sau exclud pe toate cele nepotrivite pentru situația în cauză. Ghidul nu intenționează să înlocuiască raționamentul medical la fiecare caz în parte. Decizia medicală trebuie să ia în considerare particularitățile individuale și opțiunea pacientului, precum și resursele, caracterele specifice și limitările institutilor de practica medicală. Fiecare medic care aplică recomandările în scopul stabilirii unui plan terapeutic trebuie să utilizeze propriul raționament medical independent, în funcție de fiecare caz în parte și în funcție de experiența personală în corelație cu dotarea instituției în care acesta își desfășoară activitatea.

Specialiștii care au elaborat acest ghid au depus eforturi pentru ca informația conținută în acesta să fie corectă, redată cu acuratețe și susținută de dovezi. Dată fiind posibilitatea erorii umane și/sau progresele cunoștințelor medicale, ele nu pot și nu garantează că informația conținută în ghid este în totalitate corectă și completă. Recomandările din acest ghid clinic sunt bazate pe consensul autorilor privitor la abordările terapeutice acceptate în momentul elaborării materialului.

Persoanele care au elaborat acest ghid își declină responsabilitatea legală pentru orice inacuratețe, informație percepță eronat, pentru eficacitatea clinică sau succesul oricărei metode terapeutice detaliate în acest ghid, pentru modalitatea de utilizare sau aplicare sau pentru deciziile finale ale personalului medical rezultate din utilizarea sau aplicarea lor.

De asemenea, acestea nu își asumă responsabilitatea nici pentru informațiile referitoare la produsele farmaceutice menționate în acest ghid.

1. Prof.dr.Alexandru Bucur,
2. Conf.dr.Octavian Dinca
3. S.I.dr. Cristian Vladan



DECLARAȚIE DE INTERESE

Autorii declară pe proprie răspundere că nu au beneficiat de sprijin logistic sau finanțiar, nu au fost utilizate fonduri, donații, sponsorizări sau alte instrumente de finanțare din fondul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate sau din fonduri private în elaborarea și redactarea acestui ghid de practică medicală.

Autorii declară atât în nume personal cât și din punctul de vedere al instituției unde-și desfășoară activitatea că nu au interese personale sau financiare, nu sunt în competiție academică și nu au opinii care au influență nepotrivită asupra acțiunilor lor.

Autorii declară că orice referire în cadrul ghidului de practică la produse comerciale, procese sau servicii specifice prin utilizarea numelui comercial, al mărcii sau al producătorului, nu constituie sau implică o promovare, recomandare sau favorizare din partea coordonatorului și autorilor ghidului față de altele similare care nu sunt menționate în document. Nici o recomandare din acest ghid nu poate fi utilizată în scop publicitar sau în scopul promovării unui produs.

Acest material, ca de altfel toate ghidurile clinice sunt supuse unui proces de revizuire și actualizare continuă.

1. Prof.dr.Alexandru Bucur,
2. Conf.dr.Octavian Dinca
3. S.I.dr. Cristian Vladan



În fiecare caz specific, utilizatorii ghidului trebuie să consulte literatura de specialitate specifică prin intermediul surselor independente și să confirme că informația conținută în recomandări, este corectă.

Acest material, ca de altfel toate ghidurile clinice sunt supuse unui proces de revizuire și actualizare continuă.

În următorul ghid se propun recomandări generale care sunt valabile pentru toti pacientii. Cu toate acestea, există unele situații specifice sau anormale în care recomandările sunt deosebite.

În următoarele pagini se prezintă recomandările principale pentru pacienții cu:

Perioadă	Cauză și simptome	Diagnostic diferențial	Procedură	Recomandări
1. Înainte de apariția simptomelor	Simptomele sunt:	1. INFLAMATORIE LOCALIZATĂ 2. INFLAMATORIE GENERALIZATĂ	1. Atenție la higie 2. Consultație	Higie hiperfunctională
2. În curs de evoluție	Simptomele sunt:	1. INFLAMATORIE LOCALIZATĂ 2. INFLAMATORIE GENERALIZATĂ	1. Consultație 2. Tratament	Urgență medicală
3. În urma tratamentului	Simptomele sunt:	1. INFLAMATORIE LOCALIZATĂ 2. INFLAMATORIE GENERALIZATĂ	1. Consultație 2. Tratament	Urgență medicală
4. În curs de rezolvare	Simptomele sunt:	1. INFLAMATORIE LOCALIZATĂ 2. INFLAMATORIE GENERALIZATĂ	1. Consultație 2. Tratament	Urgență medicală
5. În final de perioadă	Simptomele sunt:	1. INFLAMATORIE LOCALIZATĂ 2. INFLAMATORIE GENERALIZATĂ	1. Consultație 2. Tratament	Urgență medicală
6. În final de perioadă	Simptomele sunt:	1. INFLAMATORIE LOCALIZATĂ 2. INFLAMATORIE GENERALIZATĂ	1. Consultație 2. Tratament	Urgență medicală
7. În final de perioadă	Simptomele sunt:	1. INFLAMATORIE LOCALIZATĂ 2. INFLAMATORIE GENERALIZATĂ	1. Consultație 2. Tratament	Urgență medicală
8. În final de perioadă	Simptomele sunt:	1. INFLAMATORIE LOCALIZATĂ 2. INFLAMATORIE GENERALIZATĂ	1. Consultație 2. Tratament	Urgență medicală
9. În final de perioadă	Simptomele sunt:	1. INFLAMATORIE LOCALIZATĂ 2. INFLAMATORIE GENERALIZATĂ	1. Consultație 2. Tratament	Urgență medicală

1. Prof.dr.Alexandru Bucur,
2. Conf.dr.Octavian Dinca
3. S.I.dr. Cristian Vladan

Scrisă de Octavian Dinca
Rezultatul final este de la medicul din cadrul instituției.



Osteonecroza maxilarelor asociată terapiei antiresorbitive/antiangiogenice

Asociația Americană a chirurgilor OMF (AAOMS) a definit osteonecroza maxilarelor asociată terapiei antiresorbitive/antiangiogenice ca o complicație a utilizării medicamentelor antiresorbitive sau a unor agenți antiangiogenici, caracterizată prin apariția unei suprafețe osoase expuse la nivelul cavității orale, ce persistă mai mult de 8 săptămâni, la un pacient care nu a urmat radioterapie în regiunea oro-maxilo-facială și nu prezintă leziuni metastatice la nivelul oaselor maxilare.

Principalele preparate antiresorbitive și antiangiogenice asociate cu riscul de apariției a osteonecrozei maxilarelor sunt cuprinse în tabelul următor:

Substanță activă	Clasa	Denumire comercială	Afecțunea de fond	Cale de administrare
Acid alendronic	Antiresorbitive	FOSAMAX, FOSAVANCE	osteoporoză	per os.
Clodronat de sodiu		BONEFOS	osteoporoză	per os.
Risedronat sodic		ACTONEL, LORINE	osteoporoză	per os.
Acid ibandronic		BONVIVA, OSSICA BONDRONAT	osteoporoză	per os./i.v.
Pamidronat disodic		AREDIA	metastaze osoase	i.v.
Acid zoledronic		ZOMETA, ACLASTA	metastaze osoase, osteoporoză	i.v.
Denosumab		XGEVA, PROLIA	metastaze osoase, osteoporoză	s.c.
Sunitinib	Antiangiogene	SUTENT	tumori maligne renale, digestive	per os.
Sorafenib		NEXAVAR	tumori maligne renale, hepatice	per os.
Bevacizumab		AVASTIN	tumori maligne cerebrale, renale	i.v.
Zaltrap		ZALTRAP	tumori maligne colo-rectale	i.v.
Sirolimus		RAPAMUNE	prevenirea rejetului de transplant	per os.

1. Prof.dr.Alexandru Bucur,
2. Conf.dr.Octavian Dinca
3. S.I.dr. Cristian Vladan



Stadializarea osteonecrozei maxilarelor post-medicamentease

Stadiul I

Clinic:

- se obiectivează la examenul clinic suprafețe de os denudat sau arii de necroză osoasă, limitate la procesul alveolar, fără a fi prezente semne de infecție;
- tulburări de sensibilitate fără etiologie dento-parodontală.

Radiologic:

- imagine nespecifică de liză osoasă la nivelul procesului alveolar sau resorbție osoasă fără legătură aparentă cu leziuni dento-parodontale

Stadiul II

Clinic:

- se obiectivează la examenul clinic suprafețe de os denudat sau arii de necroză osoasă, limitate la procesul alveolar; cu prezența semnelor clinice de infecție;
- fistule mucozale cu punct de plecare osos și sau/și tegumentare, fără etiologie dento/parodontală;
- tulburări de sensibilitate fără etiologie dento-parodontală.

Radiologic:

- imagine nespecifică de liză osoasă la nivelul procesului alveolar sau resorbție osoasă fără legătură aparentă cu leziuni dento-parodontale

1. Prof.dr.Alexandru Bucur,
2. Conf.dr.Octavian Dinca
3. S.I.dr. Cristian Vladan



Stadiul III

Clinic:

- se obiectivează la examenul clinic suprafete de os denudat sau arii de necroză osoasă, ce se extind dincolo de procesul alveolar (ram mandibular, margine bazilară a mandibulei, sinus maxilar, etc);
- sunt prezente semne clinice de infecție;
- fistule mucozale cu punct de plecare osos și sau/și tegumentare, fără etiologie dento/parodontală;
- tulburări de sensibilitate fără etiologie dento/parodontală;
- mobilitate dentară fără etiologie ocluzală/parodontală;
- formarea de sechestre osoase;
- fractură de mandibulă în "os patologic";
- comunicare oro-antrală/oro-nazală.

Radiologic:

- liză osoasă extinsă dincolo de procesul alveolar (ram mandibular, margine bazilară a mandibulei, sinus maxilar);
- semne specifice fracturii de mandibulă;
- semne specifice sinuzitei maxilare.



Managementul pacienților tratați cu antiresorbtive/antiangiogenice

A. Pacienții care urmează să înceapă tratamentul antiresorbтив /antiangiogeniċ

A. 1. Pacienții care urmează să înceapă tratament antiresorbтив cu bifosfonați pe cale orală / intravenoasă (perfuzii anuale/trimestriale) pentru osteoporoză sau alte afecțiuni non-maligne

RECOMANDARE [Grad B]

- pacienții vor fi informați asupra **riscului redus** de apariție a osteonecrozei maxilarelor, precizându-se fără echivoc că această complicație reprezintă un efect secundar al medicației antiresorbтив și nu rezultatul tratamentului medico-dentar; în cazul pacienților căror urmează să li se administreze simultan și glucocorticoizi pe cale sistemică, aceștia vor fi informat asupra unui **risc ridicat** de apariție a osteonecrozei maxilarelor; pacienților nu li se va recomanda temporizarea inițierii tratamentului medicamentos, în baza unui presupus beneficiu în reducerea riscului de osteonecroză a maxilarelor;
- pot fi efectuate tratamente medico-dentare cu caracter conservator (odontale, endodontice, parodontale, protetice, ortodontice), fără precauții speciale;
- pot fi efectuate intervenții chirurgicale de mică ampoloare care interferă substratul osos, fără precauții speciale; nu se recomandă antibioprofilaxie/antibioterapie, dacă nu există alte indicații locale/generale pentru instituirea acestora, în baza unui presupus beneficiu în reducerea riscului de osteonecroză a maxilarelor;
- se recomandă instruirea pacientului pentru menținerea riguroasă/îmbunătățirea igienei orale și modificarea stilului de viață (abandonarea fumatului)
- se recomandă efectuarea de controale medico-dentare periodice și optimizarea resturărilor odontale/protetice, pentru a reduce riscul de producere a unor soluții de continuitate la nivelul mucoasei orale;
- pacienții vor fi informați să se prezinte la medicul dentist, sau la medicul curant care a prescris medicația antiresorbтивă, în cazul în care observă apariția următoarelor semne: apariția unor zone de os expuse în cavitatea orală, semne inflamatorii, tulburări de sensibilitate, spontan sau consecutiv unor intervenții chirurgicale de mică ampoloare care interferă substratul osos.

1. Prof.dr.Alexandru Bucur,

2. Conf.dr.Octavian Dinca

3. S.I.dr. Cristian Vladan



A. 2. Pacienții care urmează să înceapă tratament antiresorbtiv cu anticorpi anti-RANKL pentru osteoporoză sau alte afecțiuni non-maligne

RECOMANDARE

[Grad B]

- pacienții vor fi informați asupra **riscului redus** de apariție a osteonecrozei maxilarelor, precizându-se fără echivoc că această complicație reprezintă un efect secundar al medicației antiresorbitive și nu rezultatul tratamentului medico-dentar; în cazul pacienților cărora urmează să li se administreze simultan și glucocorticoizi pe cale sistemică, aceștia vor fi informat asupra unui **risc ridicat** de apariție a osteonecrozei maxilarelor; pacienților nu li se va recomanda temporizarea inițierii tratamentului medicamentos, în baza unui presupus beneficiu în reducerea riscului de osteonecroză a maxilarelor;
- pot fi efectuate tratamente medico-dentare cu caracter conservator (odontale, endodontice, parodontale, protetice, ortodontice), fără precauții speciale;
- pot fi efectuate intervenții chirurgicale de mică ampoloare care interferă substratul osos, fără precauții speciale; nu se recomandă antibioprofilaxie/antibioterapie, dacă nu există alte indicații locale/generale pentru instituirea acestora, în baza unui presupus beneficiu în reducerea riscului de osteonecroză a maxilarelor;
- se recomandă instruirea pacientului pentru menținerea riguroasă/îmbunătățirea igienei orale și modificarea stilului de viață (abandonarea fumatului);
- se recomandă efectuarea de controale medico-dentare periodice și optimizarea resturărilor odontale/protetice și a aparatelor ortodontice, pentru a reduce riscul de producere a unor soluții de continuitate la nivelul mucoasei orale;
- pacienții vor fi informați să se prezinte la medicul dentist, sau la medicul curant care a prescris medicația antiresorbtivă, în cazul în care observă apariția următoarelor semne: apariția unor zone de os expuse în cavitatea orală, semne inflamatorii, tulburări de sensibilitate, spontan sau consecutiv unor intervenții chirurgicale de mică ampoloare care interferă substratul osos.

1. Prof.dr.Alexandru Bucur,
2. Conf.dr.Octavian Dinca
3. S.I.dr. Cristian Vladan



A.3. Pacienții care urmează să înceapă tratament antiresorbțiv cu bifosfonați pe cale i.v./ anticorpi anti-RANKL sau medicație antiangiogenică pentru afecțiuni maligne

RECOMANDARE

[Grad B]

- pacienții vor fi informați asupra **riscului ridicat** de producere a osteonecrozei maxilarelor, precizându-se fără echivoc că această complicație reprezintă un efect secundar al medicației antiresorbțive/antiangiogenice și nu rezultatul tratamentului medico-dental; pacienților nu li se va recomanda temporizarea inițierii tratamentului medicamentos, în baza unui presupus beneficiu în reducerea riscului de osteonecroză a maxilarelor;
- pot fi efectuate tratamente medico-dentare cu caracter conservator (odontale, endodontice, parodontale, protetice, ortodontice), fără precauții speciale;
- pot fi efectuate intervenții chirurgicale de mică amploare care interferă substratul osos, inclusiv inserarea de implanturi endoosoase, fără precauții speciale; nu se recomandă antibioprofilaxie/antibioterapie, dacă nu există alte indicații locale/generale pentru instituirea acestora, în baza unui presupus beneficiu în reducerea riscului de osteonecroză a maxilarelor;
- se recomandă instruirea pacientului pentru menținerea riguroasă/îmbunătățirea igienei orale și modificarea stilului de viață (abandonarea fumatului)
- se recomandă efectuarea de controale medico-dentare periodice și optimizarea resturărilor odontale/protetice și a aparatelor ortodontice, pentru a reduce riscul de producere a unor soluții de continuitate la nivelul mucoasei orale;
- pacienții vor fi informați să se prezinte la medicul dentist, sau la medicul curant care a prescris medicația antiresorbțivă/antiangiogenică, în cazul în care observă apariția următoarelor semne: apariția unor zone de os expuse în cavitatea orală, semne inflamatorii, tulburări de sensibilitate, spontan sau consecutiv unor intervenții chirurgicale de mică amploare care interferă substratul osos.

1. Prof.dr.Alexandru Bucur,
2. Conf.dr.Octavian Dinca
3. S.I.dr. Cristian Vladan



B. Pacienții asimptomatici sub tratament antiresorbtiv /antiangiogenic

B.1. Pacienții asimptomatici sub tratament antiresorbtiv cu bifosfonați pe cale orală / intravenoasă (perfuzii anuale/trimestriale) pentru osteoporoză sau alte afecțiuni non-maligne

RECOMANDARE

[Grad B]

- pacienții aflați sub tratament de mai puțin de 5 ani și care nu urmează simultan tratament sistemic cu glucocorticoizi vor fi informați asupra **riscului redus** de apariție a osteonecrozei maxilarelor, precizându-se fără echivoc că această complicație reprezintă un efect secundar al medicației antiresorbitive și nu rezultatul tratamentului medico-dental; pacienților nu li se va recomanda întreruperea tratamentului medicamentos (*drug-holiday*), în baza unui presupus beneficiu în reducerea riscului de osteonecroză;
- pacienții aflați sub tratament de mai puțin de 5 ani și care urmează concomitent tratament sistemic cu glucocorticoizi vor fi informați asupra **riscului ridicat** de apariție a osteonecrozei maxilarelor, precizându-se fără echivoc că această complicație reprezintă un efect secundar al medicației antiresorbitive și nu rezultatul tratamentului medico-dental; pacienților nu li se va recomanda întreruperea tratamentului medicamentos (*drug-holiday*), în baza unui presupus beneficiu în reducerea riscului de osteonecroză;
- pacienții aflați sub tratament de mai mult de 5 ani vor fi informați asupra **riscului ridicat** de apariție a osteonecrozei maxilarelor, precizându-se fără echivoc că această complicație reprezintă un efect secundar al medicației antiresorbitive și nu rezultatul tratamentului medico-dental; pacienților nu li se va recomanda întreruperea tratamentului medicamentos (*drug-holiday*), în baza unui presupus beneficiu în reducerea riscului de osteonecroză;
- se recomandă evitarea tuturor intervenții chirurgicale de mică amploare care interferă substratul osos;
- extracțiile de necesitate, indicate în principal, fără a se limita, la extracția dentară de necesitate în cadrul tratamentului de urgență al unor traumatisme sau la tratamentul supurațiilor, vor fi efectuate doar de către medicii specialiști/primari chirurgie OMF;
- în cazul realizării unor extracții dentare, fără a se cunoaște faptul că pacientul se află sub tratament antiresorbtiv cu bifosfonați, pacientul va fi monitorizat timp de minim 8

1. Prof.dr.Alexandru Bucur,

2. Conf.dr.Octavian Dinca

3. S.I.dr. Cristian Vladan



săptămâni de la efectuarea manoperei, pentru a observa eventuala apariție a unor zone de os expuse în cavitatea orală, a unor semne inflamatorii la nivelul zonelor edentate, tulburări de sensibilitate; în cazul în care medicul dentist stabilește posibilitatea existenței unor semne sugestive pentru osteonecroza maxilarelor, pacientul va fi informat în acest sens și va fi trimis către un medic specialist/primar de chirurgie OMF pentru consult și tratament de specialitate; pacienților nu li se va recomanda întreruperea tratamentului medicamentos (*drug-holiday*).

- în cazul dinților cu leziuni irecuperabile și fără valoare protetică, se recomandă, ca alternativă la extracția dentară, practicarea amputației coronare și tratamentul endodontic, fără instrumentarea conștiției apicale;
- în cazul dinților cu afecțiuni inflamatorii pulpare, se poate realiza devitalizarea, evitând utilizarea produselor devitalizante;
- pot fi efectuate tratamente medico-dentare cu caracter conservator (odontale, endodontice, parodontale, protetice, ortodontice), fără precauții speciale;
- se recomandă instruirea pacientului pentru menținerea riguroasă/îmbunătățirea igienei orale și modificarea stilului de viață (abdandonarea fumatului);
- se recomandă efectuarea de controale medico-dentare periodice și optimizarea resturărilor odontale/protetice și a aparatelor ortodontice, pentru a reduce riscul de producere a unor soluții de continuitate la nivelul mucoasei orale;
- pacienții vor fi informați să se prezinte la medicul dentist, sau la medicul curant care a prescris medicația antiresorbțivă, în cazul în care observă apariția următoarelor semne: apariția unor zone de os expuse în cavitatea orală, semne inflamatorii, tulburări de sensibilitate, spontan sau consecutiv unor intervenții chirurgicale de mică amploare care interferă substratul osos; în cazul în care medicul dentist stabilește posibilitatea existenței unor semne sugestive pentru osteonecroza maxilarelor, pacientul va fi informat în acest sens și va fi trimis către un medic specialist/primar de chirurgie OMF pentru consult și tratament de specialitate; pacienților nu li se va recomanda întreruperea tratamentului medicamentos (*drug-holiday*).

1. Prof.dr.Alexandru Bucur,
2. Conf.dr.Octavian Dinca
3. S.I.dr. Cristian Vladan



OPȚIUNE

[Grad D]

- evaluarea riscului relativ de apariție a osteonecrozei maxilarelor la pacienții aflați sub tratament antiresorbtiv cu bifosfonați **pe cale orală**, prin determinarea valorii cross-laps:
 - cross-laps (CTx) < 0,1 ng/ml: risc ridicat de osteonecroză a maxilarelor
 - cross-laps (CTx) = 0,1-0,15 ng/ml: risc moderat de osteonecroză a maxilarelor
 - cross-laps (CTx) > 0,15 ng/ml: risc redus de osteonecroză a maxilarelor.

B.2. Pacienții asimptomatici sub tratament antiresorbtiv cu anticorpi anti-RANKL pentru osteoporoză sau alte afecțiuni non-maligne

RECOMANDARE

[Grad B]

- pacienții aflați sub tratament și care nu urmează simultan tratament sistemic cu glucocorticoizi vor fi informați asupra **riscului redus** de apariție a osteonecrozei maxilarelor, precizându-se fără echivoc că această complicație reprezintă un efect secundar al medicației antiresorbtive și nu rezultatul tratamentului medico-dentar; pacienților nu li se va recomanda întreruperea tratamentului medicamentos (*drug-holiday*), în baza unui presupus beneficiu în reducerea riscului de osteonecroză;
- pacienții aflați sub tratament și care urmează simultan tratament sistemic cu glucocorticoizi vor fi informați asupra **riscului ridicat** de apariție a osteonecrozei maxilarelor, precizându-se fără echivoc că această complicație reprezintă un efect secundar al medicației antiresorbtive și nu rezultatul tratamentului medico-dentar; pacienților nu li se va recomanda înteruperea tratamentului medicamentos (*drug-holiday*), în baza unui presupus beneficiu în reducerea riscului de osteonecroză;
- se recomandă evitarea tuturor intervențiilor chirurgicale de mică amploare care interferă substratul osos;
- extracțiile de necesitate, indicate în principal, fără a se limita, la extracția dentară de necesitate în cadrul tratamentului de urgență al unor traumatisme sau la tratamentul supurațiilor, vor fi efectuate doar de către medicii specialiști/primari chirurgie OMF;
- în cazul realizării unor extracții dentare, fără a se cunoaște faptul că pacientul se află sub tratament antiresorbtiv, pacientul va fi monitorizat timp de minim 8 săptămâni de la

1. Prof.dr.Alexandru Bucur,

2. Conf.dr.Octavian Dinca

3. S.I.dr. Cristian Vladan



efectuarea manoperei, pentru a observa eventuala apariție a unor zone de os expuse în cavitatea orală, a unor semne inflamatorii la nivelul zonelor edentate, tulburări de sensibilitate; în cazul în care medicul dentist stabilește posibilitatea existenței unor semne sugestive pentru osteonecroza maxilarelor, pacientul va fi informat în acest sens și va fi trimis către un medic specialist/primar de chirurgie OMF pentru consult și tratament de specialitate; pacienților nu li se va recomanda întreruperea tratamentului medicamentos (*drug-holiday*).

- în cazul dintilor cu leziuni irecuperabile și fără valoare protetică, se recomandă, ca alternativă la extracția dentară, practicarea amputației coronare și tratamentul endodontic, fără instrumentarea conștiției apicale;
- în cazul dintilor cu afecțiuni inflamatorii pulpare, se poate realiza devitalizarea, evitând utilizarea produselor devitalizante;
- pot fi efectuate tratamente medico-dentare cu caracter conservator (odontale, endodontice, parodontale, protetice, ortodontice), fără precauții speciale;
- se recomandă instruirea pacientului pentru menținerea riguroasă/îmbunătățirea igienei orale și modificarea stilului de viață (abdandonarea fumatului);
- se recomandă efectuarea de controale medico-dentare periodice și optimizarea resturărilor odontale/protetice și a aparatelor ortodontice, pentru a reduce riscul de producere a unor soluții de continuitate la nivelul mucoasei orale;
- pacienții vor fi informați să se prezinte la medicul dentist, sau la medicul curant care a prescris medicația antiresorbțivă, în cazul în care observă apariția următoarelor semne: apariția unor zone de os expuse în cavitatea orală, semne inflamatorii, tulburări de sensibilitate, spontan sau consecutiv unor intervenții chirurgicale de mică amploare care interferă substratul osos; în cazul în care medicul dentist stabilește posibilitatea existenței unor semne sugestive pentru osteonecroza maxilarelor, pacientul va fi informat în acest sens și va fi trimis către un medic specialist/primar de chirurgie OMF pentru consult și tratament de specialitate; pacienților nu li se va recomanda întreruperea tratamentului medicamentos (*drug-holiday*)

1. Prof.dr.Alexandru Bucur,
2. Conf.dr.Octavian Dinca
3. S.I.dr. Cristian Vladan



B.3. Pacienții asimptomatici sub tratament antiresorbтив cu bifenofonați pe cale i.v./ anticorpi anti-RANKL sau medicație antiangiogenică pentru afecțiuni maligne

RECOMANDARE [Grad B]

- pacienții vor fi informați asupra **riscului ridicat** de apariție a osteonecrozei maxilarelor, precizându-se fără echivoc că această complicație reprezintă un efect secundar al medicației antiresorbitive/antiangiogene și nu rezultatul tratamentului medico-dentar; pacienților nu li se va recomanda întreruperea tratamentului medicamentos (*drug-holiday*), în baza unui presupus beneficiu în reducerea riscului de osteonecroză;
- se recomandă evitarea tuturor intervenții chirurgicale de mică ampoloare care interferă substratul osos;
- extracțiile de necesitate, indicate în principal, fără a se limita, la extracția dentară de necesitate în cadrul tratamentului de urgență al unor traumatisme sau la tratamentul supurațiilor, vor fi efectuate doar de către medicii specialiști/primari chirurgie OMF;
- în cazul realizării unor extracții dentare, fără a se cunoaște faptul că pacientul se află sub tratament antiresorbativ/antiangiogenic, pacientul va fi monitorizat timp de minim 8 săptămâni de la efectuarea manoperei, pentru a observa eventuala apariție a unor zone de os expuse în cavitatea orală, a unor semne inflamatorii la nivelul zonelor edentate, tulburări de sensibilitate; în cazul în care medicul dentist stabilește posibilitatea existenței unor semne sugestive pentru osteonecroza maxilarelor, pacientul va fi informat în acest sens și va fi trimis către un medic specialist/primar de chirurgie OMF pentru consult și tratament de specialitate; pacienților nu li se va recomanda întreruperea tratamentului medicamentos (*drug-holiday*).
- în cazul dinților cu leziuni irecuperabile și fără valoare protetică, se recomandă, ca alternativă la extracția dentară, practicarea amputației coronare și tratamentul endodontic, fără instrumentarea conștricției apicale;
- în cazul dinților cu afecțiuni inflamatorii pulpare, se poate realiza devitalizarea, evitând utilizarea produselor devitalizante.

1. Prof.dr.Alexandru Bucur,
2. Conf.dr.Octavian Dinca
3. S.I.dr. Cristian Vladan



- pot fi efectuate tratamente medico-dentare cu caracter conservator (odontale, endodontice, parodontale, protetice, ortodontice), fără precauții speciale;
- se recomandă instruirea pacientului pentru menținerea riguroasă/ îmbunătățirea igienei orale și modificarea stilului de viață (abdandonarea fumatului)
- se recomandă efectuarea de controale medico-dentare periodice și optimizarea resturărilor odontale/protetice și a aparatelor ortodontice, pentru a reduce riscul de producere a unor soluții de continuitate la nivelul mucoasei orale;
- pacienții vor fi informați să se prezinte la medicul dentist, sau la medicul curant care a prescris medicația antiresorbțivă, în cazul în care observă apariția următoarelor semne: apariția unor zone de os expuse în cavitatea orală, semne inflamatorii, tulburări de sensibilitate, spontan sau consecutiv unor intervenții chirurgicale de mică ampoloare care interferă substratul osos; în cazul în care medicul dentist stabilește posibilitatea existenței unor semne sugestive pentru osteonecroza maxilarelor, pacientul va fi informat în acest sens și va fi trimis către un medic specialist/primar de chirurgie OMF pentru consult și tratament de specialitate; pacienților nu li se va recomanda întreruperea tratamentului medicamentos (*drug-holiday*).

1. Prof.dr.Alexandru Bucur,
2. Conf.dr.Octavian Dinca
3. S.I.dr. Cristian Vladan



C. Pacienții cu osteonecroză a maxilarelor asociată terapiei antiresorbtive /antiangiogenice

RECOMANDARE

[Grad B]

- tratamentul este coordonat de medicul specialist/primar de chirurgie OMF, în abordare interdisciplinară cu medicul curant care a prescris medicația antiresorbțivă / antiangiogenică și medicul dentist;
- obiectivele tratamentului osteonecrozei maxilarelor post-medicamenteasă sunt următoarele: ameliorarea simptomatologiei dureroase, prevenirea/controlul infecției și limitarea extensiei procesului necrotic osos;
- abordarea terapeutică a osteonecrozei maxilarelor post-medicamentease este diferențiată în funcție de stadiul evolutiv al afecțiunii, conform clasificării AAOMS, astfel:

C.1. Stadiul I

- tratament medicamentos local - irigații antiseptice pe bază de Clorhexidină 0,12%;
- nu se recomandă întreruperea tratamentului medicamentos (*drug-holiday*), în baza unui presupus beneficiu terapeutic;
- se recomandă evitarea tuturor intervenții chirurgicale de mică amploare care interferă substratul osos; extractiile de necesitate, vor fi efectuate doar de către medicii specialiști/primari chirurgie OMF, sub antibioprofilaxie;
- tratamentele medico-dentare care nu interesează osul pot fi efectuate, respectând recomandările expuse în cazul pacienților asimptomatici aflați sub tratament antiresorbțiv/antiangiogenic
- se recomandă instruirea pacientului pentru menținerea riguroasă/ îmbunătățirea igienei orale și modificarea stilului de viață (abandonarea fumatului)
- se recomandă efectuarea de controale medico-dentare periodice și optimizarea resturărilor odontale/protetice și a aparatelor ortodontice, pentru a reduce riscul de producere a unor soluții de continuitate la nivelul mucoasei orale;

1. Prof.dr.Alexandru Bucur,
2. Conf.dr.Octavian Dinca
3. S.I.dr. Cristian Vladan



- pacienții vor fi informați să se adreseze chirurgului OMF, medicului specialist care a recomandat medicația antiresorbțivă/antiangiogenică sau medicului dentist curant în cazul în care observă apariția următoarelor semne: apariția unor zone de os expuse în cavitatea orală, apariția unor semne inflamatorii la nivelul zonelor edentate, tulburări de sensibilitate, spontan sau consecutiv unor intervenții chirurgicale de mică ampoare care interferă substratul osos.

Stadiul II

- tratament medicamentos local - irigații antiseptice pe bază de Clorhexidină 0,12%;
- nu se recomandă întreruperea tratamentului medicamentos (*drug-holiday*), în baza unui presupus beneficiu terapeutic;
- antibioterapie empirică timp de 10-14 zile, cu beta-lactamine (de ex. amoxicilină) sau lincosamide (de ex. clindamicină), în doze individualizate; în cazurile în care pacientul a urmat în mod repetat regimuri antibiotice sau în situația în care nu se obține ameliorarea simptomatologiei infecțioase, se recomandă efectuarea antibiogramei;
- reducerea chirurgicală a volumului de os necrotic, pentru îndepărțarea surselor de iritație mecanică a părților moi și îndepărțarea biofilmului microbian de pe suprafața osului expus;
- se recomandă evitarea tuturor intervenții chirurgicale de mică ampoare care interferă substratul osos; extracțiile de necesitate, vor fi efectuate doar de către medicii specialiști/primari chirurgie OMF, sub antibioprofilaxie;
- tratamentele medico-dentare care nu interesează osul pot fi efectuate, respectând recomandările expuse în cazul pacienților asimptomatici aflați sub tratament antiresorbțiv/antiangiogenic
- se recomandă instruirea pacientului pentru menținerea riguroasă/îmbunătățirea igienei orale și modificarea stilului de viață (abdandonarea fumatului)

1. Prof.dr.Alexandru Bucur,
2. Conf.dr.Octavian Dinca
3. S.I.dr. Cristian Vladan



- se recomandă efectuarea de controale medico-dentare periodice și optimizarea resturărilor odontale/protetice și a aparatelor ortodontice, pentru a reduce riscul de producere a unor soluții de continuitate la nivelul mucoasei orale;
- pacienții vor fi informați să se adreseze chirurgului OMF, medicului specialist care a recomandat medicația antiresorbțivă/antiangiogenică sau medicului dentist curant în cazul în care observă apariția următoarelor semne: apariția unor zone de os expuse în cavitatea orală, apariția unor semne inflamatorii la nivelul zonelor edentate, tulburări de sensibilitate, spontan sau consecutiv unor intervenții chirurgicale de mică amploare care interferă substratul osos.

Stadiul III

- tratament medicamentos local - irigații antiseptice pe bază de Clorhexidină 0,12%;
- nu se recomandă întreruperea tratamentului medicamentos (*drug-holiday*), în baza unui presupus beneficiu terapeutic;
- antibioterapie empirică timp de 10-14 zile, cu beta-lactamine (de ex. amoxicilină) sau lincosamide (de ex. clindamicină), în doze individualizate; în cazurile în care pacientul a urmat în mod repetat regimuri antibiotice sau în situația în care nu se obține ameliorarea simptomatologiei infecțioase, se recomandă efectuarea antibiogramei;
- reducerea chirurgicală a volumului de os necrotic, pentru îndepărțarea surselor de iritație mecanică a părților moi și îndepărțarea biofilmului microbial de pe suprafața osului expus;
- sechestrele osoase mobile trebuie îndepărtate (pentru a facilita vindecarea părților moi); la pacienții cu istoric de tumori maligne se recomandă examinarea histopatologică a pieselor de rezecție osoasă și a sechestrelor, pentru a exclude o leziune metastatică;
- tratamentul fracturilor de mandibulă în "os patologic" va fi efectuat conform Ghidului de practică în chirurgia OMF;
- tratamentul supurațiilor periosoase sau ale spațiilor fasciale va fi efectuat conform Ghidului de practică în chirurgia OMF;

1. Prof.dr.Alexandru Bucur,
2. Conf.dr.Octavian Dinca
3. S.I.dr. Cristian Vladan



- se recomandă evitarea tuturor intervenției chirurgicale de mică ampoare care interferă substratul osos; extractiile de necesitate, (inclusiv extracția dinților mobili de la nivelul ariei de os necrotic) vor fi efectuate doar de către medicii specialiști/primari chirurgie OMF, sub antibioprofilaxie;
- tratamentele medico-dentare care nu interesează osul pot fi efectuate, respectând recomandările expuse în cazul pacienților asimptomatici aflați sub tratament antiresorbțiv/antiangiogenic
- se recomandă instruirea pacientului pentru menținerea riguroasă/îmbunătățirea igienei orale și modificarea stilului de viață (abandonarea fumatului)
- se recomandă efectuarea de controale medico-dentare periodice și optimizarea resturărilor odontale/protetice și a aparatelor ortodontice, pentru a reduce riscul de producere a unor soluții de continuitate la nivelul mucoasei orale;
- pacienții vor fi informați să se adreseze chirurgului OMF, medicului specialist care a recomandat medicația antiresorbțivă/antiangiogenică sau medicului dentist curant în cazul în care observă apariția următoarelor semne: apariția unor zone de os expuse în cavitatea orală, apariția unor semne inflamatorii la nivelul zonelor edentate, tulburări de sensibilitate, spontan sau consecutiv unor intervenții chirurgicale de mică ampoare care interferă substratul osos.

1. Prof.dr.Alexandru Bucur,
2. Conf.dr.Octavian Dinca
3. S.I.dr. Cristian Vladan



BIBLIOGRAFIE:

1. Bucur A, Niță T, Dincă O, Vlădan C, Bucur MB. A Case Series of Osteoporosis Patients Affected by Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaws. *Acta Endo*, 2011, 7(4): 483-490
2. Dincă O, Bucur MB, Bodnar D, Vlădan C, Bucur A. Extensive Osteonecrosis of the Mandible after Therapy with Denosumab Following Bisphosphonates Therapy. *Acta Endo*, 2014, 10(3): 457-462
3. Dincă O, Zurac S, Stăniceanu F, Bucur MB, Bodnar DC, Vlădan C, Bucur A. Clinical and histopathological studies using fibrin-rich plasma in the treatment of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw. *Rom J Morphol Embryol*. 2014;55(3):961-4
4. Pădurariu L. Studii clinice și contribuții în diagnosticul și tratamentul osteonecrozelor post-medicamente. Conducător științific Prof.Dr.Alexandru Bucur. UMF „C.Davila” , 2015
5. Pădurariu C, Bucur MB, Dincă O, Vlădan C, Bucur A. Bisphosphonate-related osteonecrosis of the upper jaw. *Medicine in Evolution*, 2015, Volume XXI, No.1:131-134
6. Pădurariu C, Bucur MB, Dincă O, Vlădan C, Bucur A. Minimal invasive treatment of oral bisphosphonate related osteonecrosis of the jaw: a case report. *Medicine in Evolution*, 2014, Volume XX, No. 4:671-674
7. Vlădan C. Considerații asupra osteonecrozei maxilarelor asociate terapiei cu bifosfonați – teză de doctorat. Conducător științific Prof.Dr.Alexandru Bucur. UMF „C.Davila” București, 2013
8. Vlădan C, Bucur MB, Măru C, Dincă O, Bucur A. Osteonecrosis of the jaws in patients treated with bisphosphonates: an update. *Medicine in Evolution* Volume XIX, 2013, (2):353-357
9. Vlădan C, Dincă O, Bucur MB, Niță T, Bucur A. Bisphosphonate-realtd osteonecrosis of the jaws - a case series review. *Medicine in Evolution* Volume XVIII, 2012, (1):60-64
10. Vlădan C,Dincă O, Bucur MB, Niță T, Bucur A. Acute maxillary sinusitis following bisphosphonate-associated osteonecrosis of the upper jaw:a case report. *Romanian Journal of Rhinology*, 2012, Vol.2, No.7:149-152
11. American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw - 2014 Update. *J Oral Maxillofac Surg*, 2014;1(72):1938-56.
12. European Medicine s Agency. Further measures to minimise risk of osteonecrosis of the jaw with bisphosphonate medicine.
13. Malins, T. Dental Management of Patients Prescribed Bisphosphonates - Clinical Guidance.
14. Rodriguez-Lozano FJ, Oñate-Sánchez R.E. Treatment of osteonecrosis of the jaw related to bisphosphonates and other antiresorptive agents. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal*, 2016;21(5):595-600
15. Ruggiero SL et al. American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons position paper on medication-related osteonecrosis of the jaw-2014 update. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery: Official Journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons*,2014; 72(10):1938-56
- 16.Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme. Oral Health Management of Patients at Risk of Medication-related Osteonecrosis of the Jaw.